



DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

## PREPARO DO PACIENTE PARA DE PUNÇÃO DE TIREÓIDE GUIADA POR ULTRASSOM

Preparo do paciente para realização do exame e pós procedimento:

### PREPARO DO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DO EXAME:

- Suspende o uso de anticoagulante:
  - Heparina 24 horas antes;
  - AAS, Aspirina, Melhoral e Bufferin: suspender 5 dias antes (caso não seja possível, o procedimento poderá ser realizado sem problemas);
  - Plavix, Marevan, Marcomar, Varfarina, Coumadin e antiagregantes plaquetários, após autorização do médico que prescreveu, por 5 dias antes do procedimento.
- Outras medicações de uso diário não precisam ser suspensas;
- O paciente deverá vir acompanhado;
- Comparecer de sutiã e camisa abotoada na frente;
- Devem ser apresentados resultados anteriores, se houver.

### ORIENTAÇÃO PÓS-PROCEDIMENTO:

- O paciente deverá manter gelo no local por 2 horas;
- O paciente não deverá dirigir após a punção, por 24 horas;
- Colocar gelo no local da punção por 2 dias seguidos (3 a 4 vezes ao dia durante 20 minutos).

### OBSERVAÇÃO:

1. Comparecer ao setor de radiologia 30 minutos antes do horário agendado para realização do exame;
2. Comparecer na Unidade para a realização do exame com acompanhante maior de 18 anos.



DIAGNÓSTICO POR IMAGEM